

Andere Formen der Auseinandersetzung mit der Abtreibungstötung können sein:

- Tagebuchaufzeichnungen
- Schreiben von Gedichten, Büchern, Briefen
- Malen von Bildern und Zeichnungen zum Thema: Kind, Tod, usw.
- Umsetzung der Problematik in Musik

Man beachte bitte:

Niemand kann eine Schuld wegtherapieren!

Der Herr über Leben und Tod, unser Vater, vergibt die Schuld bei echter Reue zu Gott. Denn Er liebt Sie gerade dann, wenn Sie nicht mehr zu recht kommen. Die Katholiken empfangen in der Beichte sogar die sakramentale Lossprechung, die ihnen die Gewißheit gibt, daß die Sünden wirklich vergeben sind.

**Glaube nicht, daß Abtreibung die Lösung ist,
denn Deine Seele kannst Du nicht töten.
Sie wird nicht mit dem Klinik-Müll entsorgt.
Über Abtreibung sprechen alle,
aber wer spricht mit Dir über das Danach?**

E-Mail: post@aktion-leben.de

Internet: www.aktion-leben.de

V.i.S.d.P.: AKTION LEBEN e.V.



Die Aktion Leben e.V. ist eine christliche Bürgerinitiative zum Schutz des menschlichen Lebens von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Gerne senden wir Ihnen weitere kostenlose Informationen.

Ich möchte

- Informationen über Abtreibung
- Sexualität
- Euthanasie
- Förder-Mitglied der Aktion Leben werden
(Sie haben hierdurch keine finanzielle Verpflichtung!)

AKTION LEBEN e.V.



Postfach 61 - D-69518 Abtsteinach/Odw.
Spendenkonto: 17914
Volksbank Überwald, BLZ: 50961685
BIC: GENODE51ABT
IBAN: DE83509616850000017914

Name _____ Vorname _____ Straße _____

PLZ _____ Ort _____ Beruf _____

Konfession _____ Geburtsdatum _____ Datum _____ Unterschrift _____

Mitglieder werden regelmäßig informiert F-PAS:GRAA Bitte deutlich schreiben!



**Abtreibung -
und danach ... ?**

Folge-Erscheinungen nach Abtreibungs

1. Direkt-Komplikationen

- Verletzungen der Gebärmutter, Blutungen
- Infektionen und ihre Folgen, wie Fieber, Entzündungen

2. Spätere Komplikationen

- Unfruchtbarkeit
- Menstruationsstörungen
- Verwachsungen im Unterleib
- Fehlgeburten und Frühgeburten bei späteren Schwangerschaften
- erhöhte Säuglingssterblichkeit (während und nach der Geburt)
- vermehrt Eileiter- und Bauchhöhlenschwangerschaften

3. Psychosomatische Folgeerscheinungen

- Menstruationsbeschwerden
- funktionelle Unterleibsbeschwerden (d.h. ohne direkte organische Ursache)
- funktionelle Sexualstörungen
- Migräne, Schlafstörungen, Alpträume

4. Seelische Folgeerscheinungen

- Unkontrolliertes, unbegründetes Weinen
- Allgemeine Angstzustände
- Stimmungsschwankungen, Unausgeglichenheit
- Zeichen nervlicher Schwäche, z.B. Schweißausbrüche
- Zittern, Erröten, Erblassen innere Unruhe
- Schwierigkeiten bei Konzentrations- und Gedächtnisleistungen
- Depressionen
- Scham-, Reue- und Schuldgefühle
- Selbstmordgedanken und Selbstmordversuche
- Absterben des Gefühlslebens „Roboterfeeling“
- Gefühl der emotionalen Gleichgültigkeit
- Gefühl der Einsamkeit bzw. des Beschmutztseins hinsichtlich der Beziehung zu Gott und den Menschen
- Störung des Selbstwertgefühls
- Autoaggressionen (Nägelkauen, Zähneknirschen, Kratzen, provozierte Unfälle)
- Medikamenten-, Alkohol- und Drogenmißbrauch
- Haß- und Ekelgefühle gegenüber der Sexualität

- Nicht angemessene Gefühlreaktionen z.B. bei schlürfenden Staubsaugergeräuschen
- zwanghaftes Wiedererleben der Abtreibung in der Erinnerung
- erneute Schwangerschaft als „Ersatzobjekt“ für das verlorene Kind (z.T. zwanghafter Kinderwunsch) - dadurch bedingt:
- Mehrfachabtreibung (zwanghafte Wiederholung)
- Wut und Haß gegenüber dem Kindsvater, dem abtreibenden Arzt, Männern generell
- Nicht angemessene Gefühlsregungen beim Anblick einer Schwangeren bzw. eines Säuglings
- Erhöhter gefühlmäßiger Widerstand bei frauenärztlichen Untersuchungen
- Angst vor „Bestrafung“ durch schwere Krankheiten oder Unfälle der anderen Kinder (Niobe-Syndrom)

Grund dieser Krankheiten ist die massive Verdrängung des Erlebten. Diese Symptome werden manchmal nach langer Zeit erst der Abtreibung zugeordnet und als mögliche Folgen anerkannt. (Quelle: Rahel) Natürlich kann das nicht heißen, daß alle Frauen, die an einer solchen Krankheit leiden, deshalb abgetrieben haben müssen.

Krisenzeiten können verstärkt auftreten:

- unmittelbar nach dem Eingriff (Wundschmerz - Hormonumstellung)
- in den ersten Wochen nach der Abtreibung
- um den errechneten Geburtstermin
- am Jahrestag der Abtreibungstötung
- nach der Geburt eines Kindes in der Familie oder im Bekanntenkreis
- nach einem Todesfall in der Familie oder im engeren Bekanntenkreis
- bei einer Enttäuschung /Krach z.B. in der Ehe
- ganz massiv im Klimakterium
- auf dem Sterbebett

Manche Frauen versuchen durch

- besonderes Engagement im Kampf gegen die Abtreibungstötung (in Lebensrechtsgruppen) ihr inneres Gleichgewicht wiederzufinden
- andere engagieren sich in militanten Frauengruppen (Sozialisierung der Schuld)
- oder durch besonders soziales Engagement (z.B. Aufnahme eines Pflegekindes oder Adoptionskindes)